

# การใช้ผลิตภัณฑ์นิโคติน กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยง

(เด็กคลอดเสียชีวิต / เด็กต้องอยู่ ICU / คลอดก่อนกำหนด / เด็กคลอดน้ำหนักตัวน้อย ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์)

ใช้ผลิตภัณฑ์นิโคติน ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.62 เท่า

ใช้กัญชา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.65 เท่า

**ใช้ทั้ง 2 อย่าง ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2.18 เท่า**

## ความเสี่ยง

- ◆ เด็กเสียชีวิตขณะคลอด เพิ่มขึ้น 1.76 เท่า
- ◆ เด็กเสียชีวิตหลังคลอด เพิ่มขึ้น 2.87 เท่า
- ◆ คลอดก่อนกำหนด เพิ่มขึ้น 1.83 เท่า
- ◆ โรคแทรกซ้อนรุนแรงในมารดา เพิ่มขึ้น 1.63 เท่า
- ◆ ทารกต้องเข้าอยู่ ICU เพิ่มขึ้น 1.78 เท่า
- ◆ เด็กคลอดตัวเล็กกว่าอายุครรภ์ เพิ่มขึ้น 1.94 เท่า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสพ.)



งานวิจัยขนาดใหญ่  
วิเคราะห์หญิงตั้งครรภ์ 3,129,259 ราย ระหว่างปี 2012 - 2019

สหรัฐอเมริกาใช้กัญชา 23,007 คน

ใช้ผลิตภัณฑ์นิโคติน 56,811 คน

ใช้ทั้ง 2 อย่าง 10,312 คน

อ้างอิง : Higher Risk of Infant Death Tied to Dual Cannabis, Nicotine Use in Pregnancy  
<https://www.medpagetoday.com/obgyn/pregnancy/110005>

